



Studio Dr. Pietro Verri

Odontoiatra e Protesista Dentale • Perfezionato in Parodontologia Clinica e Peri-Implantologia

Via Colonnello Elia 34/A – 73026 Borgagne (LE)
info@studioverri.com • www.studioverri.com • Iscr. Albo Odontoiatri Lecce n. 545
Via Clementina Palma 70 – 73024 Maglie (LE)
328 837 4617

CONSENSO INFORMATO – ENDODONZIA

Terapia canalare (devitalizzazione) · Ritrattamento endodontico

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e Nome	Data di nascita
Codice Fiscale	Telefono / Email



SCANSIONA

Informativa estesa disponibile online

<https://www.studioverri.com/consensi/endodonzia-esteso.pdf>

Il presente modulo riassume le informazioni essenziali relative a: endodonzia (terapia canalare, devitalizzazione, ritrattamento). La versione completa e dettagliata del consenso informato — comprensiva di descrizione approfondita delle procedure, rischi rari, bibliografia scientifica di riferimento e ulteriori dettagli clinici — è consultabile inquadrando il QR code con il proprio smartphone, oppure richiedendola al personale dello studio.

PROCEDURA PROPOSTA

Dente: _____ N° canali stimati: _____ Prima seduta / Ritrattamento: _____ Data: _____

DESCRIZIONE SINTETICA

La terapia canalare (devitalizzazione) rimuove la polpa dentale infetta o necrotica, decontamina i canali radicolari con strumenti rotanti in nichel-titanio e soluzioni irriganti (ipoclorito di sodio, EDTA), e obtura ermeticamente i canali con materiale biocompatibile (guttaperca e cemento). Il dente trattato perde la sensibilità ma rimane funzionale. Al termine è necessario il restauro definitivo, che di norma prevede la ricostruzione con perno endocanalare e corona protesica.

PRINCIPALI RISCHI E COMPLICANZE

- dolore e gonfiore post-operatorio transitorio (1–5 giorni), sensibilità alla masticazione** Comuni:
- flare-up endodontico (riacutizzazione infiammatoria); impossibilità di completare la terapia per calcificazioni o anatomia complessa** Non comuni:
- frattura di strumento nel canale (< 3%), perforazione radicolare, fallimento endodontico con necessità di ritrattamento o apicectomia** Rari:
- un dente devitalizzato diventa più fragile: il restauro definitivo con perno e corona è fortemente raccomandato**
Nota:

ALTERNATIVE

- Estrazione del dente (con successiva valutazione per impianto o bridge) · Monitoraggio (solo in polpiti reversibili)

CONDIZIONI DA COMUNICARE

- Allergie (anestetici, nichel-titanio, latex) · Terapia anticoagulante · Immunodepressione · Gravidanza

Il/La paziente dichiara di aver ricevuto spiegazioni verbali esaurienti, di aver potuto porre domande e di esprimere consenso libero e consapevole. La firma è revocabile in qualsiasi momento (L. 219/2017).

Data e luogo: _____

Firma del/della Paziente: _____

Firma del Clinico: _____

Trattamento dati: art. 9 GDPR 2016/679 – solo per finalità di cura. Informativa completa disponibile in studio.