



Studio Dr. Pietro Verri

Odontoiatra e Protesista Dentale • Perfezionato in Parodontologia Clinica e Peri-Implantologia

Via Colonnello Elia 34/A – 73026 Borgagne (LE)
info@studioverri.com • www.studioverri.com • Iscr. Albo Odontoiatri Lecce n. 545
Via Clementina Palma 70 – 73024 Maglie (LE)
328 837 4617

CONSENSO INFORMATO – ORTODONZIA FISSA TRADIZIONALE

Trattamento con brackets metallici o estetici • Archi • Trazione • Contenzione

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e Nome	Data di nascita
Codice Fiscale	Telefono / Email



SCANSIONA

Informativa estesa disponibile online

<https://www.studioverri.com/consensi/ortodonzia-fissa-esteso.pdf>

Il presente modulo riassume le informazioni essenziali relative a: ortodonzia fissa tradizionale (brackets metallici o estetici, archi, contenzione). La versione completa e dettagliata del consenso informato — comprensiva di descrizione approfondita delle procedure, rischi rari, bibliografia scientifica di riferimento e ulteriori dettagli clinici — è consultabile inquadrando il QR code con il proprio smartphone, oppure richiedendola al personale dello studio.

PROCEDURA PROPOSTA

Arcata/e: _____ Tipo brackets: _____ Durata stimata: _____ Data inizio: _____

DESCRIZIONE SINTETICA

L'apparecchio fisso tradizionale è composto da brackets incollati sulle superfici dentali e collegati da archi progressivi che esercitano forze calibrate per spostare i denti. I brackets possono essere metallici (acciaio), estetici (ceramica, zaffiro) o linguali (posizionati sul lato interno). Il trattamento dura in media 18–30 mesi, seguito da una fase di contenzione obbligatoria con retainer fisso e/o rimovibile, senza la quale la ricaduta è probabile.

PRINCIPALI RISCHI E COMPLICANZE

- dolore/pressione dopo le attivazioni (2–4 giorni), ulcere mucose da attrito, difficoltà nell'igiene, distacco occasionale dei brackets** Comuni:
- decalcificazioni/carie in zone a igiene difficile, riassorbimento radicolare (solitamente lieve e clinicamente irrilevante)** Non comuni:
- riassorbimento radicolare severo, allergia al nichel (brackets metallici) con necessità di passare a brackets ceramici o linguali** Rari:
- la contenzione è indispensabile e permanente: senza retainer, i denti tendono a spostarsi nuovamente** Nota:

IMPEGNI DEL PAZIENTE

- Igiene orale meticolosa con scovolini interdentali e irrigatore • Evitare cibi duri/appiccicosi • Presentarsi ai controlli ogni 4–6 settimane • Indossare la contenzione al termine

CONDIZIONI DA COMUNICARE

- Allergia al nichel/metalli • Parodontite attiva • Bruxismo • Resorbi radicolari pregressi • Gravidanza

Il/La paziente dichiara di aver ricevuto spiegazioni verbali esaurienti, di aver potuto porre domande e di esprimere consenso libero e consapevole. La firma è revocabile in qualsiasi momento (L. 219/2017).

Data e luogo: _____

Firma del/della Paziente: _____

Firma del Clinico: _____

Trattamento dati: art. 9 GDPR 2016/679 – solo per finalità di cura. Informativa completa disponibile in studio.