



Studio Dr. Pietro Verri

Odontoiatra e Protesista Dentale • Perfezionato in Parodontologia Clinica e Peri-Implantologia

Via Colonnello Elia 34/A – 73026 Borgagne (LE)
info@studioverri.com • www.studioverri.com • Iscr. Albo Odontoiatri Lecce n. 545
Via Clementina Palma 70 – 73024 Maglie (LE)
328 837 4617

CONSENSO INFORMATO – PROTESI SU IMPIANTI

Corone implanto-supportate • Bridge su impianti • Sovraprotesi • All-on-4/6

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e Nome	Data di nascita
Codice Fiscale	Telefono / Email



SCANSIONA

Informativa estesa disponibile online

<https://www.studioverri.com/consensi/protesi-su-impianti-esteso.pdf>

Il presente modulo riassume le informazioni essenziali relative a: protesi su impianti (corone, bridge, sovraprotesi, All-on-4/6). La versione completa e dettagliata del consenso informato — comprensiva di descrizione approfondita delle procedure, rischi rari, bibliografia scientifica di riferimento e ulteriori dettagli clinici — è consultabile inquadrando il QR code con il proprio smartphone, oppure richiedendola al personale dello studio.

PROCEDURA PROPOSTA

Impianto/i: _____ Tipo protesi: _____ Carico: _____ Data: _____

DESCRIZIONE SINTETICA

La protesi implantare è la sovrastruttura (corona, bridge o protesi rimovibile/fissa) collegata agli impianti osteointegrati mediante monconi avvitati o cementati. La fase protesica inizia dopo la conferma dell'osteointegrazione (3–6 mesi dall'inserimento). Il clinico rileva l'impronta (tradizionale o digitale) e il laboratorio realizza la protesi definitiva. Le protesi possono essere avvitate (rimovibili dal clinico per manutenzione) o cementate.

PRINCIPALI RISCHI E COMPLICANZE

- **peri-implantite (infezione con perdita ossea progressiva)**, richiede trattamento specifico e può portare alla perdita dell'impianto Complicanze biologiche:
- **allentamento o frattura della vite del moncone, frattura della ceramica o del framework, scollamento della protesi cementata** Complicanze meccaniche:
- **variazione del colore gengivale, recessione dei tessuti molli peri-implantari nel tempo** Estetica:
- **il mantenimento professionale regolare (ogni 3–6 mesi) è indispensabile per la longevità della protesi implantare**
Nota:

IMPEGNI DEL PAZIENTE

- Igiene orale meticolosa con scovolini e irrigatore orale • Sedute di mantenimento periodiche • Segnalare subito qualsiasi mobilità o dolore

CONDIZIONI DA COMUNICARE

- Bruxismo (necessaria protezione occlusale notturna) • Allergie a metalli o ceramica • Fumo

Il/La paziente dichiara di aver ricevuto spiegazioni verbali esaurienti, di aver potuto porre domande e di esprimere consenso libero e consapevole. La firma è revocabile in qualsiasi momento (L. 219/2017).

Data e luogo: _____

Firma del/della Paziente: _____

Firma del Clinico: _____

Trattamento dati: art. 9 GDPR 2016/679 – solo per finalità di cura. Informativa completa disponibile in studio.