



Studio Dr. Pietro Verri

Odontoiatra e Protesista Dentale • Perfezionato in Parodontologia Clinica e Peri-Implantologia

Via Colonnello Elia 34/A – 73026 Borgagne (LE)
info@studioverri.com • www.studioverri.com • Iscr. Albo Odontoiatri Lecce n. 545
Via Clementina Palma 70 – 73024 Maglie (LE)
328 837 4617

CONSENSO INFORMATO – PROTESI MOBILE

Protesi totale (dentiera) • Protési parziale scheletrata • Provvisori rimovibili

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e Nome	Data di nascita
Codice Fiscale	Telefono / Email



SCANSIONA

Informativa estesa disponibile online

<https://www.studioverri.com/consensi/protesi-mobile-esteso.pdf>

Il presente modulo riassume le informazioni essenziali relative a: protesi mobile (dentiera totale, parziale scheletrata, provvisori rimovibili). La versione completa e dettagliata del consenso informato — comprensiva di descrizione approfondita delle procedure, rischi rari, bibliografia scientifica di riferimento e ulteriori dettagli clinici — è consultabile inquadrando il QR code con il proprio smartphone, oppure richiedendola al personale dello studio.

PROCEDURA PROPOSTA

Tipo: _____ Arcata: _____ Materiale: _____ Data: _____

DESCRIZIONE SINTETICA

La protesi mobile viene rimossa dal paziente per la pulizia. La protesi totale (dentiera) sostituisce tutti i denti su un'arcata e si sostiene tramite adesione alla mucosa e/o supporti implantari (sovraprotesi). La protesi parziale scheletrata si aggancia ai denti residui tramite ganci metallici o attacchi di precisione. La realizzazione richiede più sedute: impronte, registrazione oclusale, prova estetica, consegna e successivi aggiustamenti.

PRINCIPALI RISCHI E COMPLICANZE

- periodo di adattamento (4–8 settimane): difficoltà nella fonazione, masticazione e deglutizione; ulcere da decubito che richiedono aggiustamenti** Comuni:
- frattura della protesi per caduta o per carichi eccessivi; riassorbimento progressivo dell'osso alveolare che richiede ribasature nel tempo** Non comuni:
- allergia alla resina acrilica (monomero residuo); in portatori di sovraprotesi, complicanze peri-implantari** Rari:
- la protesi mobile richiede ribasature o rifacimento ogni 5–7 anni a causa del fisiologico riassorbimento osseo** Nota:

IMPEGNI DEL PAZIENTE

- Rimozione notturna (almeno 6–8 ore) • Pulizia quotidiana con spazzolino dedicato e compresse effervescenti • Controlli annuali

CONDIZIONI DA COMUNICARE

- Allergie all'acrilico o ai metalli • Osteoporosi (influenza il riassorbimento osseo) • Xerostomia

Il/La paziente dichiara di aver ricevuto spiegazioni verbali esaurienti, di aver potuto porre domande e di esprimere consenso libero e consapevole. La firma è revocabile in qualsiasi momento (L. 219/2017).

Data e luogo: _____

Firma del/della Paziente: _____

Firma del Clinico: _____

Trattamento dati: art. 9 GDPR 2016/679 – solo per finalità di cura. Informativa completa disponibile in studio.